

Patient information
Forholdsregler efter injektion m BOTOX

Hævelse

Mindre hævelse i de behandlede muskler er ikke usædvanlig. Sov med hovedet højt. Hævelsen vil hurtigt aftage. Det er ikke unormalt at der kan komme små blå mærker på kinden v indstiksstederne. Ved udbredt tiltagende hævelse eller vejrtrækningsbesvær kontaktes klinikken eller skadestuen.

Smerter

Der kan forventes lette smerter efter operationen. Langt de fleste smerter kan behandles med indtagelse af PANODIL/PAMOL/PINEX tabletter som fås i håndkøb. Hvis det vurderes at der er behov for yderligere smertestillende har du fået dette ordineret og kan indtage det efter anvisningen på tabletterne. Ved stærke smerter kontaktes klinikken.

Virkning

Botox virker ved at afslappe musklerne. Virkningen indtræder gradvist og den maksimale virkning kommer efter et par uger. Alt efter dosis, er det typisk nødvendigt at gentage behandlingen efter ca 3-4 måneder.

Venlig hilsen
Torben H. Thygesen

Klinik for Kæbekirurgi
CVR. nr. 45 41 85 45
Vestre Stationsvej 15, 5000 Odense C
Tlf. 50 65 62 66 www.klinik-vs15.dk



Find os på Facebook: Klinik for Kæbekirurgi og del gerne dine oplevelser med os